



## DISERBO SORGO

| <i>Epoca d'impiego</i> | <i>Infestanti controllate</i>   | <i>Sostanza attiva</i>   | <i>% di S.a.</i>                                 | <i>l o kg /ha</i>                                | <i>Limitazioni d'uso e note</i>  |
|------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Pre semina</b>      | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Glifosate  | 30,7   | 1,5 - 3  | <b>Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto</b><br>Utilizzare in presenza di infestanti emerse |
| <b>Pre emergenza</b>   | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Aclonifen  | 49   | 1 - 1,5  |  |
| <b>Post emergenza</b>  | Dicotiledoni                    | 2,4-D + MCPA<br>Dicamba + Prosulfuron<br>(S-metolaclo + Terbutilazina) (1)<br>Bentazone<br>Dicamba | 31 + 25<br>50 + 5<br>(28,9 + 17,4)<br>87<br>21,2 | 0,3 - 0,5<br>0,3 - 0,4<br>3<br>1,1 - 1,5<br>0,75 | <b>(1) Complessivamente in 1 anno al massimo 0,75 kg/ha di sostanza attiva di Terbutilazina</b> Intervenire a 4-6 foglie                               |