



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegato n. 1

Decreto n. 28 del 16.09.2013

PROTOCOLLO DI UTILIZZO DEI VACCINI INATTIVATI

I vaccini per la protezione dal virus della febbre catarrale degli ovini, sierotipi BTV1 e BTV8, è stato messo a disposizione dalla Regione Sardegna è il seguente:

- Zuvac Ovis BTV 1-8.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna immagazzina i lotti inviati dalla Ditta Pfizer Italia, sino al ritiro da parte dei Servizi veterinari delle ASL dei quantitativi a loro assegnati da parte del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità.

Ciascun Ente, che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, e a distribuire il vaccino, dovrà:

- garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione/utilizzazione;
- tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella Scheda SBT08 (allegato alla nota del Ministero della Salute n. DGVA.VIII-2751-PI.8.d/18 del 06-02-2004), compilato secondo le istruzioni allegate alla stessa nota (Sezione 8). Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione.

I Servizi Veterinari locali assicurano che:

- la somministrazione del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel programma di vaccinazione e nel rispetto delle buone pratiche veterinarie;
- gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati utilizzando la Scheda SBT09 compilata secondo le istruzioni allegate alla stessa nota di cui sopra (Sezione 8);

I Servizi veterinari hanno la responsabilità di informare gli allevatori dei possibili effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione contro la BT e contestualmente dei vantaggi della vaccinazione in relazione alla perdite legate alla presenza della malattia e dell'infezione.

Devono altresì informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare immediatamente al Servizio Veterinario della ASL competente eventuali effetti indesiderati.

SCHEMA VACCINALE DI SOMMINISTRAZIONE

PRESENTAZIONE DEL VACCINO INATTIVATO PER I SIEROTIPI BTV1 E BTV8

Il vaccino è costituito da un flacone di propilene da 20 ml. (10 dosi), contenente una sospensione di virus inattivato dei sierotipi BTV1 e BTV8, adiuvato con idrossido di alluminio e saponina.

Specie

Il vaccino è destinato agli animali della specie ovina.

Indicazioni

Protegge gli animali vaccinati dall'infezione, dalla viremia e dai sintomi clinici di malattia provocati dal virus della Blue tongue sierotipi BTV1 e BTV8.

Controindicazioni

Nessuna allo stato delle conoscenze attuali.

Effetti collaterali

La vaccinazione potrebbe provocare piccoli gonfiori nel sito dell'inoculo e/o lieve febbre, di breve durata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Precauzioni particolari

- Vaccinare solo animali in buono stato di salute;
- Prestare particolare attenzione agli animali in gravidanza;
- Somministrare il vaccino sterilmente;

Modalità di somministrazione

Agitare prima dell'utilizzo evitando la formazione di bolle, poiché queste potrebbero aumentare la reazione locale nel sito di inoculo.

La dose è di **2 ml** da somministrare sottocute secondo il seguente schema vaccinale:

OVINI Prima immunizzazione:

- prima iniezione per gli animali di età superiore ad 1 mese d'età (2 mesi ½ se figli di madri vaccinate).
- seconda iniezione dopo 21-30 giorni dopo la prima.

Richiami successivi:

Una iniezione entro sei mesi dall'ultima somministrazione di vaccino.

Movimentazione

Gli ovini che hanno completato la prima immunizzazione o che sono stati sottoposti al richiamo annuale possono essere movimentati ai sensi del presente Decreto, dopo almeno 21 giorni e non oltre sei mesi dall'ultima vaccinazione.

Sovradosaggio ed antidoti

Nessun effetto eccetto quelli sopra citati sono stati osservati in caso di sovradosaggio.

Tempo di sospensione

Nessuno

Incompatibilità

Non miscelare con altri vaccini.

Modalità di conservazione

Conservare tra i +2°C and +8°C. Tenere al riparo della luce. Non congelare.