

DISERBO FINOCCHIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Linuron Oxadiazon Clomazone (2)	38,72 37,6 34,86 30,74	2,50 0,5 - 1 1 - 2 0,30	(1) Non utilizzare in terreni sabbiosi; trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione. Non effettuare il trapianto prima di 7 - 8 gg dal diserbo (2) Ammesso 1 solo intervento indipendentemente dall'epoca
Post emergenza e Post trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin (1) (2) Linuron (2) Clomazone (3) Clorprofam (4)	34,1 37,6 30,74 40,8	2 - 3 0,5 - 1 0,30 4 - 6	(1) Non utilizzare in terreni sabbiosi; trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione (2) Intervenire in post emergenza dopo la 4° foglia e in post trapianto al superamento della crisi. Preferire le dosi più basse e frazionare gli interventi (3) Ammesso 1 solo intervento indipendentemente dall'epoca (4) Non ammesso in post trapianto
	Graminacee	Ciclossidim	10,9	1,5 - 2,5	